

婦人良方

姙娠

十二之五

12

卷之十二

妊娠門

隨月服藥將息法一

惡阻方二

痰逆不食方三

胎動不安方四

胎漏下血方五

卒然下血方六

驚悸胎及僵

仆方七

胎上逼方八

下如豆汗胎動脇痛方九

誤服毒藥胎動方十

心痛方十一心脇痛方十二

中惡方十三

腰脇背痛方十四小脇痛方十五

心脇脹滿方十六

卷之十三

妊娠門

數墮胎方一胎不長方二

胎不安方三

墮胎後血下方四未足月欲產方五

斷產方六

咳嗽方七

吐血衄血方八

子煩方九

煩躁口乾方十

卷之十四

妊娠門

中風方論一 風痙方論二

瘕瘕方論三

新附

鬼胎方論四

傷寒方論五

疳氣方論六

熱病方論七

傷寒熱病防損胎方論

熱病胎死腹中方論九

瘧疾方論十

霍亂方論十一

卷之十五

妊娠門

泄瀉方論一 下痢黃水方論二

大小便不通方論三

小便不通方論四 子淋方論五

遺尿方論六

尿血方論七

胎水腫滿方論八

腸內鍾鳴方論九

龍共彥德孕癰方十

不語方十一

傷食方論十二 臍燥悲傷方論十三

太醫院校註婦人良方大全卷之十二

江右臨川陳自明良甫編

太醫院使立齋薛已校註

建邑書林泗泉余彰德梓

妊娠疾病門

胎後已明須知妊娠疾病故以次之

妊娠諸病忌毒藥餘當對症依法治之

妊娠隨月服藥將息法第一

千金云妊娠一月名始胎飲食精熟酸美受御宜食太麥母食腥辛是謂纔正是月足厥陰脉養不可針灸其經此經內屬於肝肝主筋血一月之內血行否澁不為力事寢必安靜毋令恐畏况一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿

胞急卒有所下當預安之宜服烏雄雞湯

烏雄雞湯方

烏雄雞一隻治如食法

吳茱萸一兩

茯苓

阿膠各二兩

生薑

甘草各一兩

人參

芍藥

白朮各三兩

麥門冬五合去心

右以水一斗二升煮雞取汁六升下藥煮取三升內酒二升

并膠等取汁三升分三服

補胎湯 若曾傷一月胎者當預服此藥

細辛一兩

防風二兩

烏梅一升

吳茱萸

生地黃

白朮各一兩

大麥五合

生薑四兩

右以水七升煮取汁二升半分三服寒多倍細辛茱萸熱多

去細辛茱萸加枯薑根二兩有所思去太麥加栢子仁三合
一方有人參一兩忌生菜蕪荑桃李雀肉等物

妊娠二月足少陽脉養不可針灸其經此經內屬於膽膽主精
是時兒精成於胞裡當謹護勿驚動况二月始陰陽踞經有寒
不成有熱即萎卒中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛
卒有所下乍寒乍熱艾葉湯主之

艾葉湯方

丹參 三兩 當歸

人參

麻黃

去節

艾葉

阿膠 二兩 甘草 一兩

大棗 十二枚

生薑 六兩

右以酒三升水一斗內藥煮減半去滓內膠煎取三升分三

服忌海藻菘菜

大醫方林言如人良方

黃連湯 若曾傷二月胎者當預服此藥

黃連

人參各一兩

吳茱萸合五

生地黄兩五

生薑兩三

右以醋漿七升煮取三升分四服日三夜一每十日作一劑
若覺不安加烏梅一升加烏梅者不用漿直用水忌猪肉冷水
蕪荑二方加當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操
弓矢欲生女者弄珠璣欲子美數視璧玉欲子賢良端正清虛
是謂外象而內感者也是月手心主脉養不可鍼灸其經此經
內屬於心母悲哀思慮驚動蓋三月為定形有寒則太便清有
熱則小便難不赤即黃卒驚恐憂愁瞋恚喜頓仆動於經脉腹
滿繞臍苦痛腰痛卒有所下宜服雄雞湯

雄鷄湯方

雄鷄

一隻治如食法

甘草炙

茯苓

人參

阿膠

各二兩炒

黃芩

白朮

各一兩

芍藥

四兩

麥門冬

去心五合

大棗

十二枚擘

生薑

一兩切

右以水一斗五升煮鷄臠半內藥煮取一半入清酒三升

膠再煎取三升分三服日飲盡忌海藻菰菜酢物桃李雀肉

等一方有當歸川芎二兩無黃芩生薑

扶神湯

若曾傷二月胎者當預服此藥

扶神

丹參

龍骨

阿膠

當歸

甘草炙

人參

赤小豆

大棗

十一枚擘

右酢漿一斗煮取三升分四服七日後服二劑腰痛加桑寄生

生二兩深師方有薤白二兩麻子一升忌同前

妊娠四月以受水精始成血脉其食稻稗其羹魚鴈是謂成血
氣以通耳目而行經絡是月手少陽脉養不可針灸其經此經
內輸三焦其時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食蓋四月
為離經有寒心下溫溫欲嘔胸滿不食小便如淋臍下苦急卒
中風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛或時胎上胸煩
不安卒有所下宜服菊花湯主之

菊花湯方

菊花如鷄子大一枚

麥門冬去心一升

麻黃去節

阿膠炙各二兩

生薑五兩

甘草炙

當歸

半夏洗各二兩

人參一兩五錢

大棗十二枚擘

調中湯

右以水八升煮減一半內清酒三升并阿膠煎取三升分三服溫卧當汗以粉撲之獲風寒四五日忌食如前

芍藥四兩

甘草炙

芎藭

續斷各一兩

柴胡

白朮各三兩

烏梅一分

李根白皮三兩

當歸一兩五錢

生薑四兩

厚朴炙

枳實各二兩

右以水一斗煮取三升分四服日三夜一八日每服一劑

方有半夏二兩忌海藻松菜桃李雀肉

妊娠五月始受火精以成其氣晏起沐浴浣衣居處必厚其衣蒙期吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和菜更調以五味是謂養氣以定五臟是月足太陰脉養不可鍼灸其經此經內

輸於脾其時兒四肢成無大飢無甚飽無食乾燥無自炙熱無大勞倦蓋五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒則嘔瀉痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛蜷欲作卒有所下宜服阿膠湯又名旋覆花湯主之

阿膠湯方

阿膠炙 四兩

人參一兩

麥門冬去心 一升

生薑兩

吳茱萸七合

旋覆花

當歸

芍藥

甘草炙

黃芩各二兩

右以水九升煮取三升內清酒三升并阿膠微火煎取三升半分四服日三夜一先食後服便愈不差更服忌海藻菘菜安中湯 若曾傷五月胎者當預服此方

甘草炙

芍藥各三兩

當歸

人參

生地黃

芎藭各二兩

五味子合五

生薑大兩

麥門冬

去心一升大麻仁合五

大棗三十五枚擘黃芩一兩

右以水七升清酒五升煮取三升半分四服日三夜一七日

再服一劑忌如前

安胎當歸湯 若妊娠五月舉動愕胎不安小腹痛引腰脇小

便下血ス

當歸

阿膠炒

芎藭

人參各一兩

大棗十二枚

艾一把

右以酒水各三升煮至二升去滓內膠令烊分三服

甘草無參棗

妊娠六月始受金精以成筋身欲微勞無得靜處出遊於野數
觀走犬走馬食忌鷲鳥猛獸之內是謂變膜理紉筋以養其力
以堅背脊是月足陽明脉養不可針灸其經此經內屬於胃主
其口目蓋六月之時兒口目皆成調五味食甘美毋大飽六月
卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿體腫驚怖忽有所下腹痛
如欲產手足煩疼宜服麥門冬湯

麥門冬湯方

麥門冬去心 一升

甘草炙

人參各一兩

生地黄三兩

黃芩二兩

阿膠炒四兩

生薑六兩

大棗十五枚擘

右以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三升分三服如
人行三四里進糜粥已海藻菰菜蕪荑

柴胡湯

若曾傷六月胎者當預服之

柴胡

四兩

芍藥

一方作紫葳

白朮

甘草

炙各二兩

麥門冬

三兩去心

從蓉

兩

芎藭

兩

生地黄

五兩

生薑

六兩

大棗

三十枚擘

右以水一斗煮取三升分四服日三夜一仍進糜粥七日更

服三劑忌海藻松菜蕪荑桃李雀肉等一方有黃芩二兩

旋覆花湯

亦名田疳

集驗療妊娘六七月胎不安常處ラ

旋覆花

一兩

厚朴

製

白朮

枳殼

黃芩炒

茯苓

各三兩

半夏

炒一方無

芍藥

生薑

各二兩

右以水一斗煮取二升半先食分五服日三夜一忌羊肉錫

醋桃李雀肉等千金同

大醫明抄註婦人良方 卷之六
妊娘七月始受水精以成骨勞身搖肢無使定止動作屈伸以
運血氣自此後居處必節飲食避寒暑食粳稻以密腠理是謂
養骨而堅齒是月手太陰脉養不可鍼灸其經此經內屬於肺
主皮毛是時兒皮毛已成無太言無號哭無薄衣無洗浴無寒
飲若忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥陰脉若傷寒煩熱腹
滿短氣常苦頸項腰背強宜服葱白湯

葱白湯方

葱白十五枝

半夏細切

麥門冬去心

人參一兩五錢

生薑八兩

甘草炙

當歸

黃芪炒各三兩

阿膠炒四兩

黃芩一兩

旋覆花一兩

右以水八升煮減至內清酒三升并膠煎取四升溫服一升

日三夜一溫卧當汗出無汗加麻黃二兩秋後勿強汗忌美肉錫海藻松菜等

杏仁湯 若留傷七月胎者當預服

杏仁

去雙仁皮火碎

甘草

鐘乳

麥門冬

吳茱萸

各一分

五味子

粳米

各五合

紫苑

右以水八升煮取三升半分四服日三夜一七日服二劑忌

海藻松菜

姙娘八月始受王精以成膚革和心靜息無使氣極是謂周密膝理光澤顏色是月手陽明脉養不可針灸其經此經內屬於大腸大腸主九竅是時兒九竅皆成無食燥物無輒失食無忍太氣若中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安舌頭

眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或寒慄腰背苦
冷痛而目視茫茫宜服芍藥湯

芍藥湯方

芍藥

錢四

人參

當歸

甘草

炙各二兩

白朮

兩一

厚朴

二兩製

薤白

切一升

生薑

切四兩

右以水五升酒四升煮取三升分四服日三夜一忌海藻松
菜桃李雀肉等類

葵子湯

若胃傷八月胎者當預服

甘草

炙

柴胡

白朮

各二兩

厚朴

薑製

芍藥

葵子

仁

生薑

六兩

大棗

二十枚擘

右以水九升煮取三升分四服日三夜一服三劑忌猪肉

冷水蕪夷桃李雀肉酢物等類

妊娘九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮多才力是月足少陰脉所養不可針灸其經此經內屬於腎腎主續縷皆成無處溫冷無著衣荏萃下痢腹滿懸急上衝腰背痛不可轉側短氣宜服半夏湯方

半夏炮炒五合

麥門冬去心五合

乾薑炮一兩

當歸

吳茱萸

阿膠多各三兩

大棗十二枚擘

右以水九升煮取三升去粗內白蜜八合微火溫分四服痢即止忌生血物飭

猪腎湯 若魯傷九月胎者當預服

猪腎具一

茯苓

桑寄生

乾薑炮

生地黃

芎藭

各三兩

白朮

四兩

麥門冬

一升

附子

大者一枚

右以水一斗煮猪腎熟去之內諸藥煎三升半分四服日三夜一十日更一劑忌猪肉蕪荑桃李雀肉酢物

妊娠十月五臟俱備六腑通納天地氣於丹田故使關節人事皆備但俟時而生

愚按妊娠所禁之法皆傳自上古當永為遵守其方藥用須斟酌

芎藭補中湯 治懷孕血氣不能榮養以致半產子嘗治一妊娠不定月而損墜服此藥遂安

乾薑煨

阿膠炒

芎藭

五味子

各五分

黃芪炒

當歸

白朮

杜仲炒

白芍藥錢各

木香

人參

甘草炙各五分

右水煎服

妊娠惡阻方論第二

妊娠惡阻病在腎謂之子病巢氏病源謂之惡阻由胃氣怯弱中脘停痰脉息和順但肢體沉重頭眩擇食惟嗜酸醢甚者寒熱嘔吐胸膈煩滿半夏茯苓丸主之

愚按前症若中脘停痰用二陳湯加枳殼若飲食停滯用六君子加枳殼若脾胃虛弱用異功散若胃氣不足用人參橘皮湯兼氣惱加枳殼胸脇痞悶再加蘇梗脇痛再加柴胡若飲食少思用六君子加紫蘇枳殼頭暈體倦用六君子湯若

脾胃虛弱嘔吐不食用半茯苓湯蓋半夏乃健脾氣化痰滯
之主藥也脾胃虛弱而嘔吐或痰涎壅滯飲食少思胎不安
必用茯苓半夏湯倍加白朮然半夏白朮茯苓陳皮砂仁善
能安胎氣健脾胃予常用驗矣

附治驗

一姪娘嘔吐惡食體倦嗜卧此胃氣虛而惡阻也用入參橘皮
湯二劑漸愈又用六君加紫蘇二劑而安

一姪娘吞酸惡心時欲作嘔此因脾胃虛而飲食停滯用六君
加枳殼香附治之而愈

一姪婦停食腹滿嘔吐吞酸作瀉不食余以爲飲食停滯兼肝
木傷脾土用六君子湯以健脾胃加蒼朮厚朴以消飲食

萊菔所製黃連以清肝火諸症悉愈又以六君加砂仁調理而脾土乃安

白朮湯 治胃虛惡阻吐水甚至十餘日粥漿不入

白朮錢炒一 人參錢五 丁香 甘草錢炒各二分

右薑水煎服

人參橘皮湯 治阻病嘔吐痰水飲食少思肢體倦怠

人參 橘紅 白朮錢炒 麥門冬錢去心

白茯苓錢各一 厚朴錢製 甘草錢五

右加竹茹薑水煎服

保生湯 治妊娠惡阻少食嘔吐或兼吐瀉作渴

人參錢一 甘草錢炒 白朮錢炒 香附

大醫方廣論 卷之五 十一

烏梅

橘紅各五

右薑水煎服

安胎湯

治體倦惡食或胎動腹痛或下血發熱

甘草炒

茯苓

當歸

熟地黃自製

川芎

白朮炒

黃芪炙

白芍藥炒

半夏湯泡

阿膠切炒

地榆各五

右薑水煎服

又方縮砂仁為末每服二錢薑湯或米飲調下

附方

二陳湯

方見二十四卷第五論

六君子湯

方見二十四卷第六論

異功散 方見二十二卷第三論

半夏茯苓湯 方見後

妊娠痰逆不食方論第三

妊娠嘔逆者乃水飲停積爲痰輕者妨食嘔逆甚者腹痛傷胎皆由胃氣不健或風冷外乘所致也

愚按前症因食停滯用半夏茯苓湯加枳殼蕪氣惱更加柴胡因痰壅滯用半夏茯苓湯加白朮因風寒外傷用參蘇飲飲食腹脹用香砂六君子湯寒熱嘔吐入參養胃湯

附治驗

一妊婦嘔吐脇脹或寒熱往來面色青黃此木旺而尅脾土用六君子加柴胡桔梗枳殼而安

一妊婦嘔吐酸水胸滿不食此脾土虛而肝木所侮用六君子加芍藥而愈又用四君子加枳殼桔梗而安

一妊婦胸腹膨脹吐痰不食此脾胃虛而飲食為痰用半夏茯苓湯漸愈又用六君子加枳殼蘇梗桔梗而飲食如常後因患怒脇脹不食吐痰惡心用半夏茯苓湯加柴胡山梔而愈

半夏炮炒

陳皮各一錢

白茯苓二錢

砂仁

炒一錢

甘草

炒五分

右用薑棗烏梅水煎服一二劑後用茯苓丸

茯苓丸

治妊婦煩悶頭暈聞食吐逆或腦腹痞悶

赤茯苓

人參

桂心

乾薑炮

半夏

泡洗炒黃

橘紅

各一兩白朮炒

葛根

甘草

炒

枳殼

炒各二兩

右為末蜜丸桐子大每服五十九米飲下日三服

四七湯

方見十一卷第七論

附方

參蘇飲

方見六卷第十三論

六君子湯

四君子湯

香砂六君子湯

三方見二十四卷第六論

人參養胃湯

方見八卷第十八論

胎動不安方論第四

妊娠胎動或飲食起居或衝任風寒或跌仆擊觸或怒傷肝火

或脾氣虛弱當各推其因而治之若因母病而胎動但治其母
若因胎動而母病唯當安其胎輕者轉動不安重者必致傷墜
若面赤舌青是兒死也面青舌赤吐沫是母死也唇口色青兩
邊沫出是子母俱死也察而治之

愚按前症胎氣鬱滯者用紫蘇飲脾氣虛弱者六君子湯加
蘇殼鬱結傷脾者歸脾湯加柴梔鬱怒傷肝脾者四七湯加
芩歸怒動肝火者加味小柴胡湯若胎已死急用平胃散加
朴硝腐化之二

附治驗

一姪婦內熱晡熱或兼寒熱飲食少思其胎或下墜或上攻此
肝經血虛而火動耳先用加味道遙散數劑次用六君子加

柴胡枳殼各數劑而愈

一妊婦因感寒熱胸脇脹痛嘔吐不食狀如傷寒此怒動肝火脾氣受傷也用六君子加柴胡山梔枳殼牡丹皮而愈但內熱口乾用四君子加芩歸升麻柴胡而安

釣藤湯

治妊娘胎動腹痛面青冷汗氣欲絕者

釣藤鈎

當歸

茯神去木

人參各一錢

苦梗

一錢五分

桑寄生一錢

右水煎服

煩熱加共六

石膏

黃芪湯

治氣虛胎動腹痛下水

糯米

一合

黃芪炒

川芎各兩

右水煎分三服

順氣飲子 產前服之安胎

紫蘇葉 木香炮 人參 草豆蔻

茯苓各一兩 甘草炒五錢 大腹子一兩氣弱不用

右每服三錢 芎藭根三寸 糯米少許 水煎服

安胎寄生湯 治姙娠下血或胎不安或腰腹作痛

桑寄生 白木各五錢 茯苓四錢 甘草一錢

右水煎服

又方好銀煮取水入葱白作羹食之

又方川芎二兩 葱白五兩 水三碗 煮二碗 半分三服

四物湯加熟艾 阿膠 茯苓 或芎藭 補中湯 杜仲 左若妙方並見

附方

紫蘇飲方見十二卷第八論

六君子湯

四君子湯二方見二十四卷第六論

加味小柴胡

方見二十四卷第二論

平胃散

方見七卷第十八論

加味逍遙散

歸脾湯二方見二十四卷第四論

妊娠漏胎下血方論第五

妊娠經水時下此由衝任氣虛不能約制蓋心小腸二經相為表裏上為乳汁下為月水故妊娠經水壅之以養胎蓄之以為乳若經水時下名曰胞漏血盡則斃矣

愚按前症若因風熱用防風黃芩丸若因血熱用加味逍遙散若因血虛用二黃散若因血去太多用八珍湯末應補中

益氣湯若因肝火用柴胡山梔散若因脾火用加味歸脾湯
若因事下血作痛用八珍湯加阿膠熟艾若因脾胃虛弱用
補中益氣湯加五味子若因脾胃虛陷用前湯倍用升麻柴
胡若補熱內熱宜用逍遙散

附治驗方藥

一姓婦下血服涼血之藥下血益甚食少體倦此脾氣虛而不
能攝血余用補中益氣湯而愈後因怒而寒熱其血仍下此
肝火旺而血沸騰用加味逍遙散血止用補中益氣湯而安
一姓婦下血發熱作渴食少體倦屬脾氣虛而肝火所侮用四
君子加柴胡山梔血止因怒復作用六君子加柴胡山梔升麻
而安

二黃散 治胎漏下血或內熱肺熱或頭痛頭暈或煩躁作渴
或脇肋脹痛等症

生地黃

熟地黃自製

右爲末每服三錢煎白朮枳殼湯調下二黃須拌膏爲丸庶
藥不枯槁而有力也

防風黃芩丸

方見後

加味歸脾湯

加味道遙散

人參湯 三方見二十四卷第四論

四君子湯

補中益氣湯

六君子湯 三方見二十四卷第六論

柴胡山梔散 方見二十四卷第三論

產後下血方論第六

妊娠下血因冷熱不調七情失宜氣血不和所致若傷於胎則痛而下血甚則胎墮矣

愚按前症若因氣怒用小柴胡湯若因風熱用一味防風丸若因血熱用一味子芩丸若因脾氣虛弱用六君子湯若因中氣下陷用補中益氣湯若氣血而下血者乃因見小飲少也不必服藥

附治驗

一妊娠六月每怒下血甚至寒熱頭痛脇腹痠作嘔少食余謂寒熱頭痛乃肝火上升脇腹痠痛乃肝氣不行作嘔少食乃肝侮脾胃小使下血乃肝火血熱用小柴胡加芍藥炒黑

山梔茯苓白朮而愈

一妊娘六月體倦食少勞役下血用六君加當歸熟地升麻柴

胡而愈

安胎散 治卒然腰痛下血

熟地黃自製

艾葉

白芍藥炒

川芎

黃芪炒

阿膠炒

當歸

甘草炒

地榆各五分

右薑棗水煎服

附方

子芩丸 治肝經有熱妄行用細條黃芩炒為末每服一錢以

秤鍾燒赤焙酒熱調服若脾胃虛不宜用

防風丸 治肝經有風以致血得風而流散不歸經用防風為

婦人良方 卷二 十六

末每服一錢白湯調服

防風黃芩丸

治肝經有風熱致血崩便血尿血用條芩炒焦

防風等分爲末酒糊丸桐子大每服三五十九食遠或食前

米飲或溫酒送下

小柴胡湯

方見二十四卷第二論

六君子湯

補中益氣湯二方見二十四卷第六論

妊娠驚胎及信方論第七

妊娠驚胎者乃懷妊將滿胎神已具墜仆傷胎甚至下血不醒

若欲驗其子母安否當參第四論治之

愚按前症若因怒跌仆或手足抽搐用釣藤湯若因氣滯用紫蘇飲若因脾胃氣虛用六君子加蘇梗若鬱結傷脾用歸

脾湯若鬱怒傷肝脾用四七湯加芎歸若去血過多佛手散如不應膠艾湯氣血虛八珍加膠艾

神妙佛手散

治胎痛服之即安胎損服之立下

即芎歸湯

當歸

川芎

各五錢

右水酒煎血崩昏暈用冰煎服

治姙娠從高墜下腹痛下血

生地黃

益母草

各二錢

當歸

黃芪

各一錢

右薑水煎服

膠艾湯

治姙娠頓仆胎動不安腰腹疼痛或胎上搶或去血

腹痛

阿膠

炙一兩

熟艾葉

數莖

右以水三碗煮取二碗分三服

又方川芎末二錢酒下二三服胎生即安胎死即下

又方失所胎動或子煩飲竹瀝一升立愈

又方縮砂和皮炒為末每服二錢米飲下腹熱即安

秦朮湯

方見前

安胎散

治頓仆胎動腰腹痛

方見前

附方

四七湯

治七情鬱結成痰或如梅核鯁於喉間或中脘停痰

氣痞或痰壅氣喘或痰飲中脘嘔逆惡心

紫蘇葉

厚朴

薑製

茯苓

各一錢

半夏

薑製一錢五分

右薑棗水煎白濁送青州白丸子極妙

加味四物湯 治症同前

又方治寒邪所犯心腹作痛

桂枝

芍藥 炒

半夏 各一錢

茯苓

厚朴 薑製

枳殼 炒

甘草 炒 各五分

人參

紫蘇 各一錢

右薑棗水煎服

釣藤湯 方見前

紫蘇飲 方見後

六君子湯 方見二十四卷第六論

歸脾湯 八珍湯 二方見二十四卷第四論

妊娠胎上逼方

妊娠將養如法則血氣調和胎得其所而產亦易否則胎動氣

此症亦難甚至危矣

愚按前症若氣逆胎上用紫蘇飲飲食不甘兼以四君子若
內熱哺熱兼以逍遙散若胃火所致用四君子兼以枳殼柴施
若脾鬱所致用歸脾湯加柴施枳殼

附治驗

一妊婦每因恚怒其胎上逼左關脉弦洪乃肝火內動用小柴
胡加茯苓枳殼山施而愈但體倦不食用六君子調養脾土
加柴胡枳殼調和肝氣乃瘥

一妊婦胎上逼腦滿嘔氣飲食少思此脾氣鬱滯用紫蘇飲頻
安又用四君子加枳殼柴胡山施而瘥

紫蘇飲 治子懸腹痛或臨產驚恐氣結連日不下或大小便

不利

當歸

甘草炙

大腹皮黑豆浸水包

人參

川芎

橘皮

白芍藥炒各五分

紫蘇錢一

右薑蔥水煎

一孕婦累日不產催藥不驗此坐草太早心懷畏懼氣結而血不行也用前飲一服便產

一婦人孕七月止衝腹痛面不赤舌不青乃子懸也亦用前飲而胎母俱安

當歸湯

治胎動煩躁或生理不順唇口青黑手足厥冷

當歸

人參

阿膠炒

甘草炒各一錢

連根葱白一握

右水四碗煎四味至半去滓下葱煎至一碗分二服

大聖散 治妊婦忪悸驚心腹脹滿連臍急痛

白茯苓 川芎 麥門冬去心 黃芪炒

當歸錢各一 人參 甘草炒 木香各五分

右薑水煎服

又方 治胎上逼熱痛下血或煩悶困篤用葱二十莖水濃煮

飲胎未死即安胎已死即下未効再服若唇口青黑手足厥

冷須佐以當歸湯

白朮湯 治遍身痛或衝心痛欲死方見後

附方

四君子湯 六君子湯二方見二十四卷第六論

逍遙散

歸脾湯

二方見二十四卷第四論

小柴胡湯

方見二十四卷第二論

愚按前症肝脾濕熱用升陽除濕湯肝脾風熱用加味逍遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯脾胃氣虛用錢氏白朮散若脾氣下陷用補中益氣湯肝經風熱用防風黃芩丸風入腸胃用胃風湯

附治驗

一姪婦因怒肺膈不利飲食少思服消導順氣之劑脾胃愈弱飲食愈少大便不實且無度久而便黃水或帶白視其面色黃中隱白余曰黃色脾虛也白色肺虛也朝以補中益氣湯

升補胃氣文以六君子培補脾氣而愈

治妊娠忽然下如豆汁等物或胎動腹痛

糯米升

黃芪炒六兩

右水煎分四服

補遺用野苧根二兩好銀三五兩或金銀首飾水酒各半煎服

附方

胃風湯

治風邪乘虛客於腸胃水穀不化泄瀉下注腹脇虛

滿腸鳴作痛及腸胃虛熱下如豆汁或瘀血日夜無度方見第八

卷第
十一論

東垣升陽除濕湯

治婦人女子漏下惡血月事不調或暴崩

不止多下水漿之物皆由飲食失節或勞傷形體或素患心

氣不足因於勞傷分倦致氣虛火乘脾其脈緩而弦急按之洪大皆脾土受邪也

柴胡

羌活

蒼朮

黃芪

炒各一錢五分

防風

甘草

升麻

藁本

各一錢

蔓荊子

七分獨活

當歸

各五分

右水煎食前服

加味逍遙散

加味歸脾湯二方見二十四卷第四論

防風黃芩丸

方見前

補中益氣湯

六君子湯二方見二十四卷第六論

錢氏白朮散

方見二十一卷第二論

此方服法詳前

愚按前症若因毒藥用甘草黑豆淡竹葉若因頭仆用阿膠散未應煎送知母丸若因頭仆下血腹痛用佛手散未應用八珍送知母丸血出過多用八珍湯斤許益母草四兩水煎徐徐與服若胎死以朴硝或平胃散下之

奪命丹 治小產或毒藥唇口爪青黑其胎已死

牡丹皮

白茯苓

桂心

赤芍藥各為末

桃仁去皮尖研如泥

右等分蜜丸彈子大每服一丸醋湯速進兩丸立出

同膠散 治妊婦跌仆或毒藥致胎不安

熟地黃二錢自製

白芍藥

艾葉

當歸

甘草少

阿膠炒

黃芪炒各一錢

右薑棗水煎服

藥毒胎動甘草烏火淡竹葉等分用水煮煎服

附方

知母丸 又名一母丸方見十三卷第九論

佛手散 方見

八珍湯 方見二十四卷第四論

平胃散 方見八卷第十八論

心氣痛方

妊娠心痛乃風邪痰飲交結若傷心正經為真心痛朝發夕死
夕發旦死若傷心支絡則乍安乍作若傷於子藏則胎動而下
愚按前症若飲食所傷用平胃散加枳殼山楂若因錯雜請

邪當審其因而治之

附治驗

一妊婦心痛煩熱作渴用白朮散即愈後因停食其痛仍作胸腹膨滿按之則痛此因飲食停滯用入參養胃湯按之不痛乃脾胃受傷以六君子補之而愈

一妊婦心腹作痛脇脇作脹吞酸不食此肝脾氣滯用二陳山查山梔青皮木香而愈又因怒仍痛胎動不食面色青黃肝脉弦緊脾脉弦長此肝乘其土用六君子湯加升麻柴胡木香而愈

妊婦卒心痛氣欲絕

川芎

當歸

茯苓

厚朴製各一錢

右水煎服

白朮湯 治姙娠內熱心痛

白朮

錢四

赤芍藥

錢三

黃芩

右水煎服忌桃李雀肉

雷公炮炙論云心痛欲死急覓延胡

太方青竹茹一升酒二升煮二升分三服

又方破鷄子一枚調酒服之

紫蘇飲

方見前

附方

人參養胃湯

平胃散 二方見七卷第十八論

二陳湯

方見二十四卷第五論

六君子湯

方見二十四卷第六論

本方治婦人諸症

妊娠心腹痛或宿有冷疾或新觸風寒或痰飲相搏若痛傷胞絡必致動胎甚則傷墮

愚按前症若風寒痰飲用金沸草散胎氣鬱滯加香附川芎若飲食停滯用六君加柴蘇枳殼若怒動肝火用前藥更加柴胡山梔若鬱結傷脾用歸脾湯加枳殼山梔

附治驗

一妊婦心腹作痛吐痰惡心胎氣上攻飲食少思此脾虛氣滯而為痰用六君子加柴胡枳殼諸症漸退飲食漸進又用四君子加枳殼山梔桔梗而安後因怒動胎氣脹中脘作痛惡

寒嘔吐用六君加柴胡升麻六香二劑而愈

當歸芍藥湯

治妊娠心腹急痛或去血過多而眩暈

白芍藥炒

當歸

茯苓

白朮炒

澤瀉各一錢

川芎二錢

右水煎服

阿膠散

治胎動腹痛

白茯苓

白朮炒

川芎

阿膠各一錢炒

當歸

陳皮各一錢

甘草炒三錢

右水薑棗煎服

治胎動腹痛欲落上等銀一斤茅根二斤去黑炭水五碗煮取

三碗入清酒一碗并茅根煎數沸徐徐服立安全銀首飾亦可

附方

金沸草散

方見六卷第十二論

紫蘇飲

方見前

四君子湯

六君子湯

二方見二十四卷第六論

歸脾湯

方見二十四卷第四論

卷中要方論第十三

妊娠若忽然心痛悶絕欲死者謂之中惡蓋因氣血不足精神衰弱故邪毒得以中之也

愚按前症當調補正氣為善用金銀藤一味煎湯飲之

又方治前症

生地黃

錢二

枳殼

錢一

木香

分三

右水煎服

又方豆豉一兩薑半兩水煎服

妊娠心腹痛或吐血衄血其熟艾如拳大煮汁服

又方用鹽一盞水調服以冷水嚥之吐出即安

又方用寗土為末每服二錢白湯調

在卷之四

腎主腰足因勞役傷損其經以致風冷乘之腰腹相引而痛蓋婦人腎以繫胞妊娠痛甚則胎墮也

愚按前症若外邪所傷用獨活寄生湯勞傷元氣用八珍杜

仲砂仁膠艾脾腎不足以前藥加白朮補骨脂氣血鬱滯用

紫蘇飲加桔梗枳殼肝火所動用小柴胡湯加白朮枳殼山

大醫附錄言婦人良方 十二卷
二十一
扼肝脾鬱結用歸脾湯加柴胡枳殼

附治驗

一妊婦頸項強直腰背作痛此膀胱經風邪所致用拔萃羌活湯一劑而愈又用獨活寄生湯及八珍湯以祛邪固本而痊通氣散 治腎虛腰痛神妙破故紙炒為末空心每服二錢嚼核桃肉半箇以溫酒下

杜仲丸 治妊娘腰背痛杜仲炒續斷酒浸等分為末煮棗肉丸桐子大每服七十九酒下米飲亦可

膠湯 治腰腹疼痛胎動欲落即前妊娘下血補遺內安散

附方

獨活寄生湯 方見四卷第七論

八珍湯

歸脾湯 二方見二十四卷第四論

紫蘇飲

方見前

小柴胡湯

方見二十四卷第二論

羌活勝濕湯

方見四卷第一論

妊娠小腹痛方論第十五

妊娠小腹痛由胞絡虛風寒相搏痛甚亦令胎動也

愚按前症若風寒所搏用紫蘇飲加生薑氣血虛用八珍湯
脾氣虛用六君子湯中氣虛用補中益氣湯若腹脹痛用安
胎飲加升麻白朮不應兼補中益氣湯

附治驗方藥

一妊婦小腹作痛其胎不安氣攻左右或時逆上小便不利用

小柴胡湯加青皮山桅清肝火而愈後因怒小腹脹滿小便不利水道重墜胎仍不安此亦肝木熾盛所致用龍膽瀉肝湯一劑諸症頓愈乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安紫蘇飲方見前

八珍湯

方見二十四卷第四論

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯

三方見二十四卷第六論

安胎飲

方見前

小柴胡湯

方見二十四卷第二論

龍膽瀉肝湯

方見二十四卷第八論

夫妊婦心腹脹滿者由脾胃虛寒復因冷飲相搏所致也
愚按前症若外感風寒內傷飲食用薑香正氣散若食傷脾胃
胃用六君子湯若陽氣壅滯用紫蘇飲

附治驗

一妊婦飲食停滯心腹脹滿或用人參養胃湯加青皮山楂枳
殼其脹益甚其胎上攻惡心不食右關脈浮大按之則弦此
脾土不足肝木所侮余用六君子加柴胡升麻而愈後小腹
痞悶用補中益氣湯升舉脾氣乃瘥
下氣湯 治心腹兩脇脹悶飲食少思四肢無力

羌活

赤芍藥炒

甘草炒

枳榔

青皮

大腹皮

陳皮

赤茯苓

半夏鹽製

桑白皮炒各五分

桂心一分

紫蘇莖一錢

右水煎服

局方枳殼散保風散紫蘇飲藿香正氣散皆良

附方

六君子湯

補中益氣湯二方見二十四卷第六論

人參養胃湯方見七卷第十八論

大醫藥院校註婦人良方大全卷之十二終

太醫院校註婦人良方大全卷之十三

江右臨川陳自明良甫編

大醫院使立齋薛已校註

建邑書林泗泉余彰德梓

妊娠數墮胎方論第一

天胎乃陽施陰化榮衛調和經養完全十月而產若血氣虛損不能養胎所以數墮也凡妊婦腰痛多墮胎

愚按丹溪先生曰陽施陰化胎孕乃成血氣虛乏不能榮養其胎則墮譬如枝枯則果落藤痿則花墜嘗治賈氏婦每有孕至三月前後必墜診其脉左右大而無力重則瀋知其血虛也補其中氣使血自榮時正初夏教以濃煎白朮湯下黃

芩末二錢與數十貼得保而生因而思之墮於內熱而虛者
於理為多曰熱曰虛蓋孕至三月上屬相火所以易墮不然
何以黃芩熟艾阿膠等為安胎之妙如此也太抵治法須審
某月屬某經育養而藥之

附治驗

一妊婦五月服剪紅丸而胎墮及腹脹痛乃服破血之劑痛益
甚手不敢近予曰此峻藥重傷脾胃也用八珍倍加參芪生
夏乳香沒藥二劑而痛止數劑而安

吳江庠史萬湖仲子室年二十餘疫疾墮胎時咳服清肺解
表之藥喘急不寐予以為脾土虛而不能生肺金藥復損而
益甚也先與補中益氣加茯苓半夏五味炮薑四劑漸愈後

性視乏用八珍加五味及十全大補湯而愈

一方鯉魚二觔煮一尾粳米一升用鹽豉煮食甚善月食三次

芎藭補中湯杜仲丸治氣虛而胎墜方見十二卷第一論

附方

十全大補湯 八珍湯二方見二十四卷第四論

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

妊娠不長方論第三

夫妊娠不長者因有宿疾或因失調以致臟腑衰損氣血虛弱而胎不長也當治其疾益其氣血則胎自長矣

愚按前症更當察其經絡審其所因而治之

附治驗

一妊婦胎六月體倦懶食面黃晡熱而胎不長因勞欲墜此脾氣不足也用八珍湯倍加參朮茯苓三十餘劑脾胃漸健胎安而長矣

一妊婦因怒寒熱往來內熱晡熱脇痛嘔吐胎至八月而不長此因肝脾鬱怒所致用六君加柴胡山梔枳殼紫蘇桂枝芍藥愈而胎亦長矣

黃芪湯 治妊娘不長更安胎和氣

黃芪

炒

白朮

炒

陳皮

麥門冬

去心

白茯苓

前胡

人參

各五

川芎

甘草

炒三

右薑棗水煎服

集驗用鯉魚長尺許如食法飲其汁其胎漸大而長矣

附方

六君子湯

方見二十四卷第六論

八珍湯

方見二十四卷第四論

妊娠胎動不安當下方論第三

夫人以胃氣壯實衝任榮和則胎得所如魚處淵若氣血虛弱無以滋養其胎終不能成也宜下之以免其禍

愚按前症宜用第十二卷十四方論主之其胎果不能安者方可議下慎之慎之

附治驗

鴻臚張淑人痢疾後胎動心神不安肢體殊倦用八珍散二十餘劑漸愈因勞加煩熱頭痛以大劑補中益氣湯加蔓荊

子治之熱痛頓止仍用前散又五十餘劑而安其後生產

桂心散 治妊娠因病胎不能安者可下之

桂心 瓜蒌 牛膝 藟麥各五 歸一錢

右水煎

又方牛膝一兩酒一鍾煎七分作二服

小品方用麥藥一升搗碎水二升煮一升服之神效觀麥藥能

損氣破血如此脾胃虛弱飲食不化者不宜用明矣

文仲取雞子一枚置三錢服之立下

佛手散服之胎死者即下生者亦安方見十二卷第七論

附方

八珍散 方見二十四卷第四論

補中益氣湯 方見二十四卷第六論

如孕婦胎後血下方論第四

隨胎後復損經脉而下血不止甚則煩悶至死皆以調補胃氣為主

愚按前症若肝經血熱用四物參朮山梔肝經風熱用防風黃芩丸肝經怒火用加味逍遙散脾經氣虛用四君歸地脾經鬱滯用加味歸脾湯氣滯不和用紫蘇飲胃氣下陷用補中益氣湯

附治驗

一妊婦墮胎昏憤不時吐痰自用養血化痰之劑昏憤不省自汗發搐痰涎湧出彼以為中風欲用祛風化痰予曰此屬脾

氣虛寒所致遂用十全大補湯加炮薑二十餘劑尋愈

治產後損動下血腹痛

阿膠一兩炒

艾葉半兩

右水一大盞煎

治墮胎下血煩滿寒熱狂悶鎊鹿角炒為末每服三錢水調下
日三服或家雞翎燒為末每服二錢溫酒下良及再服以效為度

附方

四物湯

補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

紫蘇飲 方見十二卷第八論

防風續命丸

方見十二卷第六論

加味道遙散

加味歸脾湯

十全大補湯

三方見二十四卷第四論

妊娠未足月欲產方論第五

妊娠未足月而痛如欲產或應產而難或為子煩用知母一味
蜜丸桐子大粥飲服之或槐子蒲黃等分為丸酒服或蒲黃水
調錢許並効

愚按小產重於太產蓋太產如瓜熟自脫小產如生採斷其
根蒂豈不重哉而人輕忽死於是者多矣太抵治法宜補形
氣生新血去瘀血為主若未足月痛而欲產用芎歸補中湯

倍加知母止之產而血不止人參黃芪湯補之產而心腹痛
當歸川芎湯主之元氣弱而欲產八珍湯固之出血過多而
發熱聖愈湯治之若汗不止或昏潰喘咳急用獨參湯若發
熱煩躁或肉瞤筋惕用八珍湯太渴面赤脉洪而虛者用當
歸補血湯身熱面赤脉沉而微者用四君薑附以回其陽可
也

附治驗方藥

一妊婦八月胎欲墜如產臥久少安日哺益甚此氣血虛弱朝
用健中益氣湯加茯苓半粒隨愈更以八珍湯調理而安
當歸川芎湯 治小產後瘀血心腹疼痛或發熱惡寒

當歸

川芎

熟地黃

自製

白芍藥炒

玄胡索炒

紅花

香附

青皮炒

澤蘭

牡丹皮

桃仁

右水煎入童便酒各小半盞服

若以手按腹愈痛此瘀血為患宜用此藥或失笑散消之若按之不痛此是血虛宜用四物參芩白朮若痛而作嘔此是胃虛宜用六君子若痛而作瀉此是脾虛宜六君子送二神丸

芎歸補中湯

治氣血虛而欲產

艾葉代薑

阿膠炒

川芎

五味子并炒

黃芪炙

當歸

白朮炒

芍藥炒

人參

杜仲炒各

甘草炙五

右每服五錢水煎服

若脾氣虛弱須用補中益氣湯若氣虛而有火宜用安胎飲

人參黃芪湯治小產氣虛血下不止

人參

黃芪炒

當歸

白朮炒

白芍藥炒

艾葉各一

阿膠炒二

右作一劑水煎服

當歸散治產後氣血虛弱惡露內停增寒發熱宜服此藥

當歸

白芍藥炒

川芎

黃芩炒各

白朮五

右為婦人溫重便調下二錢

聖愈湯

方見二十四卷第九論

獨參湯

方見三卷第十三論

當歸補血湯

八珍湯

二方見二十四卷第四論

補中益氣湯

方見二十四卷第六論

斷產方論第六

湯曰天地之太德曰生然婦人有臨產艱難或生育不已而欲斷之故錄驗方以備所用若服水銀、蠱、水蛭之類不惟孕不復懷且禍在反掌

愚按前云用蠶故紙尺許燒灰為末產後酒服之血虛者終

不復孕太抵斷產之劑多用峻厲往往有不起者是則產之
害未若斷產之害也吾聞閣老張羅峯太常李恒齋俱因服
斷產之劑自謂形體俱怯遇勞必病有由然矣

千金斷產用油煎水銀一斗方息空心服棗大一丸永斷其孕
且不損人

千金去胎太麴五升清酒一斗煮二沸去滓分五服隔宿勿食
且再服其胎如糜母無所苦千金不傳

四物湯每服五錢加芸臺子二撮於經行後空心溫服

雜錄方論第七

夫肺內主氣外司皮毛皮毛不密寒邪乘之則咳嗽秋則肺受
之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其嗽不已則傳於肺

妊娠病久不已則傷胎也

愚按前症若秋間風邪傷肺用金沸草散夏間火邪壯火用
人參平肺散冬間寒邪傷肺用人參敗毒散春間風邪傷肺
用參蘇飲若脾肺氣虛用六君芎歸桔梗若血虛四物桑皮
杏仁桔梗腎火上炎用六味丸加五味子煎服脾胃氣虛風
寒所傷用補中益氣加桑皮杏仁桔梗蓋肺屬辛金生於巳
土嗽久不愈者多因脾土虛而不能生肺氣而腠理不密以
致外邪復感或因肺氣虛不能生水以致陰火上炎所致治
法當壯王金生腎水為善諸臟腑嗽見六卷第十一等論

附治驗

一妊娠氣喘促甚諸藥不効素有帶下始於目下浮兩月餘其

面亦然此氣虛而有痰飲也用六味丸料數劑而愈

一妊婦嗽則便自出此肺氣不足腎氣虧損不能司攝用補中

益氣湯以培土金六味丸加五味以生腎氣而愈

一妊婦咳嗽其痰上湧日五六碗許諸藥不應予以爲此水泛

爲痰用六味丸料及四君子湯各一劑稍愈數劑而安

一妊婦因怒咳嗽吐痰兩脇作痛此肝火傷肺金以小柴胡湯

加山梔枳殼白朮茯苓治之而愈但欲作嘔此肝侮脾也用

六君子加柴胡升麻而痊

桔梗散 治風寒咳嗽喘急不食

天門冬 去心 一錢

桑白皮

桔梗 炒

紫蘇 各五分

赤茯苓 一錢

麻黃 去節 三分

貝母

人參

甘草 炒

右薑水煎

馬兜鈴散 治咳嗽氣喘

馬兜鈴

苦梗

人參

甘草

貝母

各五分

陳皮

去白

大腹皮

黑豆水浸洗

紫蘇

桑白皮

各一錢

五味子

五分

右薑水煎

百合散

治咳嗽胃膈煩悶

川百合

紫苑

麥門冬

苦梗

桑白皮

各五分

甘草

竹茹

二分

右薑水煎

治妊婦傷寒涎多咳嗽

知母

杏仁

天門冬

桑白皮各五分

右薑水煎服

旋覆花湯感冒咳嗽胃滿痰盛

方見二十一卷第四論

葶蓋散治症同上或項背拘急鼻塞頭眩時發寒熱

方見六卷第十二論

參蘇飲加杏仁五味子治症同上

附方

金沸草散

方見六卷第十二論

人參平肺散

方見二十一卷第十二論

人參敗毒散

方見二十四卷第十論

補中益氣湯

四君子湯

六君子湯

三方見二十四卷第六論

六味丸

方見二十四卷第十一論

小柴胡湯

方見二十四卷第十二論

妊娠吐血衄血方論第八

妊娠吐血由七情臟腑所傷氣逆於上致血上溢不止心悶甚
者多死或墜胎也宜用局方必勝散

愚按前症若肝經怒火先用小柴胡山梔生地次用前藥合
四物後用加味逍遙散肝經風熱防風子芩丸心經有熱硃
砂安神丸心氣不足補心湯思慮傷心妙香散胃經有火犀
角地黄湯膏粱積熱加味清胃散鬱結傷脾加味歸脾湯肺
經有火黃芩清肺飲因氣鬱滯紫蘇飲子氣不攝血用補中
益氣湯腎經虛火加味六味丸仍以七卷第五論互用

附治驗方藥

一姪娘因怒吐血兩脇脹痛小便淋瀝此怒而血蓄上隨火
出也用小柴胡合四物四劑血止用六君子安胎飲調理而
紫蘇飲治姪娘失調胎氣不安上攻作痛或氣逆失血十二

卷第八論

若肝脾氣血虛而有火不安宜兼逍遙散若脾氣虛弱而不
安宜用四君等歸

小柴胡湯

見二十四卷第

論

四物湯

補中益氣湯

六君子湯

二方見二十四卷第六論

加味逍遙散

加味歸脾湯

二方見二十四卷第四論

防風子芩丸

方見十二卷第六論

硃砂安神丸

方見三卷第十論

養心湯

方見三卷第十論

妙香散

方見三卷第十一論

安胎飲

方見十二卷第一論

犀角地黃湯

方見七卷第六論

加味清胃散

方見二十四卷第一論

黃芩清肺飲

方見八卷第一論

加味六味丸

方見二十四卷第十一論

妊娠子煩方論第九

論曰妊娠苦煩悶者以四月受少陰君火以養精六月受少陽

相火以養氣若母心驚膽寒多有是症產寶云是心肺虛熱或痰積於胃若三月而煩者但熱而已若痰飲而煩者吐涎惡食大凡停痰積飲寒熱相搏吐甚則胎動不安

愚按前症若因內熱用竹葉湯氣滯用紫蘇飲痰滯用二陳白朮黃芩枳殼氣鬱用分氣飲加川芎脾胃虛弱用六君紫蘇山梔

附治驗

一姪婦煩熱吐痰惡食惡心頭暈此脾虛風痰為患用半夏白朮天麻湯以補元氣祛風邪漸愈惟頭暈未痊乃用補中益氣湯加蔓荊子以升補陽氣而愈

竹葉湯

治子煩

防風

黃芩炒

麥門冬各一錢

白茯苓二錢

右竹葉數片水煎服

人參散

治熱乘心脾煩熱乾渴

人參

麥門冬

赤茯苓

地骨皮

乾葛

黃芩炒

犀角鎊各一錢

甘草五分

右水煎

竹茹湯

治妊娘煩燥或胎不安淡竹茹一兩水煎服之

益母丸知母炒為末棗肉丸彈子大每服一丸人參煎湯下

附方

分氣飲

治脾胃虛弱氣血不和胃脘不利或痰氣喘嗽

少思

陳皮

茯苓

半夏炒

桔梗炒

大腹皮

紫蘇梗

枳殼炒

白朮炒

山梔炒各一錢

甘草炙五分

右薑棗水煎

紫蘇飲 方見十二卷第八論

二陳湯 方見二十四卷第五論

六君子湯 補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

妊娠煩燥方論第十

足太陰脾之經其氣通於口手少陰心之經其氣通於舌若臟腑不調氣血不和以致內熱乘於心脾津液消燥故心煩口乾也與子煩大同小異宜用益母丸

愚按前症若胃經實火用竹葉石膏湯若胃經虛熱用入參黃芪散若胃經氣虛用補中益氣湯若肺經虛熱用紫蘇飲若肝經火動用加味逍遙散若脾氣鬱結用加味歸脾湯若腎經火動加味地黃丸

附治驗

一妊婦煩熱兼咽間作痛用知母散加山桅以清肺經而愈後內熱咳嗽小便自遺用補中益氣加麥門山桅以補肺氣滋腎水而痊

知母散 治煩燥悶亂口乾

知母

麥門冬

黃芪炒

手參炒

赤茯苓

錢各一

甘草

右水煎入竹瀝一合更煎二沸而服

人參黃芪散 治身熱煩燥口乾

人參

黃芪炒

葛根

秦艽

赤茯苓

麥門冬各一錢

知母

甘草五分

右薑三片竹葉二七片水煎

補遺人參白水散黃芪六一湯皆良

附方

竹葉石膏湯

石膏一錢

半夏五錢

甘草

人參各一錢

麥門冬

竹葉各五分

右薑水煎服

補中益氣湯方見二十四卷第六論

紫蘇飲方見十二卷第八論

加味逍遙散

加味歸脾湯二方見二十四卷第四論

加味地黃丸方見二十四卷第十一論

太醫院校註婦人良方大全卷之十三終

太醫院校註婦人良方大全卷之十四

江右臨川陳自明良甫編

太醫院使立齋薛已校註

建邑書林泗泉余彰德梓

妊娠中風論

論曰四時八方之氣爲風也常以冬至之日候之若從其鄉來者長養萬物否則名爲虛邪賊害萬物體虛中之客於皮膚則頑痺不仁入於筋脉則攣急喎僻若兼濕熱則弛縱痿軟若入臟腑氣隨所傷經絡而爲諸病妊娠中之必須早治庶免墮胎之患

愚按病機機要云風本爲熱熱勝則風動宜以靜勝其燥是

亦養血也治法須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮雖有汗下之戒而有中臟中腑之分中腑者多着四肢則脉浮惡寒拘急不仁中臟者多着九竅之中則唇緩失音耳聾鼻塞目瞽便秘中腑者宜汗之中臟者宜下之表裏已和宜治在經當以太藥養之此中風之要法妊婦患之亦當以此施治而佐以安胎之藥仍參三卷首論主治之為是

防風散 治妊娠中風卒倒口噤肢強或痰氣上升

防風

桑寄生

葛根各五

家菊花

細辛

防已

秦艽

當歸

桂心

茯神

甘草

羚羊角鎊各三分

右水煎入竹瀝半合服

白木酒 治妊娠中風口噤不語

白木 半一兩

獨活 兩一

黑豆 炒一合

右酒煎分四服灌之得汗即愈

補遺治妊娠中風排風湯續命湯參蘇湯加羌活引風湯皆可

選用

方見第三卷中風類

妊娠風症方論第二

論曰妊娠體虛受風而傷足太陽經遇風寒相搏則口噤背強甚則腰反張名之曰瘕瘕更自醒良久復作又名子癰子昌當審察其因而治之

愚按前症若心肝風熱用釣藤湯肝脾血虛加味道遙散肝脾鬱怒加味歸脾湯氣逆痰滯紫蘇飲肝火風熱釣藤散脾

欬痰滯二陳薑汁竹瀝若兼症相雜當參照子煩門

附治驗

一妊婦出汗口噤腰背反張時作時止此怒動肝火也用加味逍遙散漸愈又用釣藤散而止更以四君加釣藤山梔柴胡而安

一妊婦因怒忽仆地良久而甦吐痰發搐口噤項強用羚羊角散漸愈更用釣藤散始痊又用歸脾湯而安

羚羊角散

治妊娘冒悶角弓反張名曰子癇風痊

羚羊角

鎊

獨活

酸棗仁

炒

五加皮

薏苡仁

炒

防風

當歸

酒浸

川芎

茯神

木

杏仁

去皮尖

木香

甘草

炙各二分

右薑水煎

附方

釣藤湯

方見十二卷第四論

加味逍遙散

加味歸脾湯

二方見二十四卷第四論

紫蘇飲

方見十二卷第八論

釣藤散

方見四卷第四論

二陳湯

方見二十四卷第五論

四君子湯

方見二十四卷第六論

新附

新附

竊謂痙者筋脉急而縮也痙者筋脉緩而伸也一縮一伸手足

相引搐搦不已太抵與嬰孩發搐相似謂之瘳瘳也此証多屬
風蓋風主搖動駱龍吉云心主脉肝主筋心屬火肝屬木火主
熱木主風風火相熾則為瘳瘳也治法若因風熱用釣藤湯加
柴胡山梔黃芩白朮以平肝木降心火養氣血若風痰上湧加
竹瀝南星半夏若風邪急搐加全蠍僵蚕以平氣血用八珍湯
加釣藤山梔為主若無力抽搐戴眼反折汗出如珠者肝氣絕
也皆不治

附治驗方藥

一妊婦四肢不能伸服祛風燥血之劑遺屎瘳甚四肢抽搐余
謂肝火血燥用八珍湯加炒黑黃芩為主佐以釣藤湯而安
後因怒前症復作小便下血寒熱少寐飲食少思用釣藤散

加山梔柴胡而血止用加味道遙散寒熱退而得寐用六君子湯加芍藥釣藤飲食進而漸安

八珍湯

方見二十四卷第四論

六君子湯

方見二十四卷第六論

鬼胎方論第四

夫人臟腑調和則血氣充實精神健旺若榮衛虛損精神衰弱妖魅之類乘之亦如懷妊之狀故曰鬼胎也

愚按前症因七情脾肺虧損氣血虛弱行失常道衝任乖違而致之者乃元氣不足病氣有餘也若見經候不調就行調補庶無是症治法以補元氣為主而佐以雄黃丸之類行散之若脾經鬱結氣逆者用加味歸脾湯調補之若脾虛血不

足者用六君芎歸培養之肝火血耗者用加味道遙散滋抑之肝脾鬱怒者用加味歸脾逍遙二藥兼服腎肝虛弱者用六味地黃丸

附治驗

一婦人經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎症之藥不應余診視之曰面青脉濡寒熱往來肝經血病也面黃腹大少食體倦脾經血病也此鬱怒傷脾肝之症非胎也不信仍用治胎散之類不驗余用加味道遙歸脾二藥各二十餘劑諸症稍愈彼欲速效別服通經丸一服下血昏憤自汗惡寒手足俱冷嘔吐不食余用人參炮薑二劑漸愈又用十全大補湯五十餘劑而安

雄黃丸 治鬼胎瘀血腹痛

雄黃

鬼臼去毛

莽草

丹砂研細

巴豆去油

獺肝炙黃各半兩

蜥蜴炙黃一枚

蜈蚣炙黃一條

右為末蜜丸桐子大每服二丸空心溫酒下日二服或下如蛇蟻之類其病乃除

治鬼胎及血氣痛不可忍

班猫去頭翅足製

延胡索炒各等分

右為末以溫酒調下半錢以下穢物為度

附方

加味歸脾湯

加味逍遙散

十全大補湯三方見二十四卷第四論

六君子湯方見二十四卷第六論

六味丸方見二十四卷第十一論

傷寒方論第五

夫時令嚴寒體虛所傷即成傷寒輕者洒淅惡寒翕翕發熱微咳鼻塞數日而愈重者頭疼體痛寒熱交作久而不愈者多致傷胎也

愚按前症為害匪輕當審經絡表裡而治之不可輕忽加減四物湯治妊婦腹痛或月事不調胎氣不安產後血塊或亡血過多或惡露不下

當歸

川芎

白芍藥炒

熟地黃各一

右每服四五錢水煎日一二服下血加艾葉阿膠虛熱白乾

加括婁根麥門冬無血腹痛加當歸芍藥血崩血淋加熟地
蒲黃因熱生風加川芎柴胡頭昏項強加柴胡黃芩太便秘
結加太黃桃仁嘔吐惡心加白朮人參虛煩不眠加竹葉人
參煩躁大渴加知母石膏水停吐逆加猪苓茯苓虛煩傷寒
加入參柴胡防風

阿膠散 治時氣先服此以安胎却以主藥間服

阿膠炙

白朮炒

桑寄生

人參

白茯苓

右為末等分每服一錢用糯米飲調下日三服

前胡湯 治傷寒頭痛壯熱肢節煩疼

石膏錢一

前胡

甜竹茹

梔子炒

黃芩炒

大青

知母各五

右用葱白水煎服

蘇木湯 治傷寒時行洒淅寒振或熱熾者

赤芍藥

橘紅

黃芩炒

黃連

甘草

蘇木各五分

右用水煎服汗出即瘥如胎不安煎服阿膠湯

黃龍湯 治妊婦寒熱頭疼嘔嘔不食脇痛嘔痰及產後傷風

熱入胞宮寒熱如瘧或經水適來勞復熱不解散

柴胡錢二

黃芩炒

人參

甘草各一錢

右用水煎服

柴胡石膏湯 治頭痛惡寒身熱拘急口乾

柴胡錢二

甘草錢一

石膏錢二

右用薑水煎服氣虛加入參

枳實散

治傷寒四日_引至五六日腹脹少食腰疼體重

枳實

_{錢炒三}

陳皮

_{錢一}

麥門冬_{半一錢}

右用生薑葱白水煎服

旋覆花湯

治傷寒頭目旋疼壯熱心躁

旋覆花

赤芍藥

甘草_{各五分}

前胡

石膏

_{錢各一}

白朮

人參

麻黃_{去根節}

黃芩

_{分各三}

右用薑水煎服

麥門冬湯

治傷寒壯熱嘔逆頭疼胎氣不安

人參

石膏

_{錢各半}

前胡

黃芩

_{分各五}

葛根

麥門冬錢各一

右薑棗竹茹一分用水煎服

梔子大青湯 治發斑變黑尿便血

升麻

梔子錢各一

大青

杏仁

黃芩各三分

右用葱白三寸水煎服

白朮湯 治傷寒煩熱頭痛胎動或時吐逆不食

白朮

橘紅

麥門冬

人參

前胡

赤茯苓

川芎

甘草

半夏各五分

右用生薑竹茹一分水煎服

良方白朮散 治傷寒

白朮

黃芩

炒各二錢

右用薑棗水煎服若四肢厥逆其陰症也不可用

芍蘇散 治外感風寒壯熱頭疼心胸煩悶

紫蘇葉

川芎

白朮

白芍藥

麥門冬心去

陳皮

乾葛

各五分

甘草

炙三分

右用生薑葱白水煎

參蘇飲

去木香

治證同前

方見六卷第十二論

雜考時氣方論第六

論曰四季之間非其時而有其氣謂春寒夏冷秋熱冬煖之不

其

正也所感者不拘長少其症相類故云時氣妊娠患之重者多致傷胎

愚按前症與前傷寒互相生治

秦艽散 治時氣五六日不得汗口乾飲水狂言嘔逆

秦艽

柴胡各五分

石膏一

犀角鎊

赤茯苓

前胡

甘草

葛根

升麻

黃芩各四分

右用淡竹茹下分水煎服

葛根飲子 治時氣煩熱口乾頭痛

乾葛

麻黃去節根各半兩

石膏一兩

鼓合

白米半合

梔子二七枚

葱白二莖

右用水煎分三服汗出為効

芒葵飲子 治消熱六七日太小便不利

芒硝一兩細研

葵子二兩

右如前煎服以利為効芒硝即朴硝

人參敗毒散 方見二十四卷第十論

妊娠諸病方論第七

冬時觸冒嚴寒即病為傷寒藏於肌膚夏至發為暑病即熱症也妊娠患之多致墮胎熱病與中暑相似但熱病者脉實中暑者脉虛治當審察不可槩施

愚按此症與前後三症同治

治妊娘熱病頭痛嘔吐煩悶

人參無一方

竹茹

葛根各一兩

蘆根二兩

知母三兩

麥門冬去心一兩半

右每服四錢連根葱白三寸水煎

梔子仁飲 治熱病發斑黑色小便如血氣喘急胎欲落

梔子

升麻

石膏

生地黃各二錢

黃芩

大青一兩

右每服半兩葱白七寸豉四斗九粒水煎

大黃飲 治熱病六七日大小便秘澀

大黃微炒

石膏一兩

知母

前胡

赤茯苓各三分

梔子

甘草

黃芩各半兩

右每服五錢生地黄一分煎服

又方伏龍肝細研每服一錢水調下

外用
水調
塗臍下

又方葛根煮汁時服一盞

補遺蘆根湯

治熱病頭疼心煩嘔吐

知母四兩

青竹茹二兩

右每服五錢生蘆根一握糯米一撮水煎

梔子五物湯

治妊婦傷寒壯熱頭痛

梔子

前胡

知母各一兩

黃芩一兩

石膏四兩

右每服五錢用水煎服

升麻六物湯

治傷寒斑黑溺血

升麻

梔子各二兩

大青

杏仁

黃芩

右每服五錢葱頭水煎

妊娠傷寒論第八

論曰非節之氣傷於妊婦熱毒侵損胞胎若不早治多致墮胎漏血則子母之命亦不能全矣

愚按前症當分察六經為主而參於前後方論

治妊娘傷寒身痛壯熱

葱白切一

前胡

葛根

石膏各十

青黛六分

升麻八分

梔子箇十二

右用水煎分三服

治妊娠傷寒太便秘結

前胡

分十

大黃

石膏

各二分

梔子仁

枚十

知母

黃芩

茯苓

生薑

各八分

右用水煎分三服

治妊娠傷寒發斑忽黑小使如血胎欲落

梔子

升麻

各四分

青黛

兩二

生地黃

枚二十

石膏

兩八

葱白

切一

黃芩

兩三

右用水煎分三服忌熱物

又用井中泥塗心下乾則易

二方出本事再錄有効

補遺治妊娠熱病先以白朮散安胎方見前

妊娠熱病胎死腹中方論第九

論曰熱病以致胎死不能出者但服黑神散胎自下矣

愚按陳無擇先生曰前症當視產母若面赤舌青知其子死面青舌赤知母死子生唇青吐沫子母俱死若雙胎或一死一活用黑神散竊謂前症宜補助產母使其胎自下黑神散恐其太熱不宜輕用果一胎已死者用平胃散朴硝水銀下之最為穩當庶不併傷生者平胃散方見後

黑神散又名烏金散靈苑方名肉桂散

桂心

當歸

芍藥

甘草炙

乾薑炒

生地黃各一兩

黑豆炒去皮二兩

附子炮去皮臍半兩

右為末每服二錢空心用溫酒調下

補遺胎死用紅花酒煮汁飲二三碗

又方伏龍肝爲末溫酒調下二錢白湯亦可

又方朴硝末童子小便和熱酒調下三錢立出

妊娠瘡疾方論第十

論曰妊娠病瘡乃夏傷於暑客於皮膚至秋而發陽盛則熱陰盛則寒陰陽相離寒熱俱作其發晏者由風邪客於風府循督而下衛氣至三日一夜常大會於風府故發日晏與早者衛氣之行風府日下一節二十一日下至尾骶二十二日入脊內上注於伏衛之脉其行九日出缺盆其氣既止故發更早其間日發者風邪內搏五臟橫道募原其道遠其氣深其行遲不能日作也妊娠而發多傷於胎

愚按前症因脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾
或暑邪所伏審係飲食停滯用六君子加桔梗蒼朮藿香外
邪多而飲食少用藿香正氣散外邪少而飲食多用入參養
胃湯勞傷元氣用補中益氣湯若鬱怒所傷用小柴胡兼歸
脾湯若木侮土久而不愈用六君子為主佐以安胎藥乃參
三陰三陽經而治之

附治驗

一婦人因怒患瘕舉發無期久而不巳胸腹不利飲食少思吞
酸吐痰用六君子加柴胡山梔二十餘劑尋愈但哺熱少食
又用四君子加柴胡升麻為主佐以逍遙散而痊
一旌婦瘕久不巳愛氣下氣胸腹膨脹食少欲嘔便血少寐此

屬肝脾鬱怒歸脾湯加柴胡山梔漸愈又用六君子湯加

一姪婦患瘡已愈但寒熱少食頭痛晡熱內熱此脾虛血弱也

用補中益氣湯加蔓荊子頭痛頓止又用六君子湯加芎歸

飲食頓進再用逍遙散加參朮而寒熱愈

常山

厚朴薑製

青皮

陳皮並去白

甘草炒

檳榔

草菓等分

右每服半兩酒水各一碗煎至三盞去粗露一宿發時面東
溫服良久再服一姪婦先寒後熱六脉浮緊用前散一劑而
人參養胃湯治姪婦瘡疾寒多熱少或但寒不熱頭痛惡心

太醫院校書人良方

身痛面色青白脉弦逆者又有驅邪散治證亦同方見七卷第十八論

清脾湯 治妊婦瘧疾寒少熱多或但熱不寒口苦舌乾大便

秘澁不進飲食脉弦數者

青皮 厚朴薑製 白木炒 草蓂 茯苓

半夏炒 黃芩 柴胡 甘草炙各五分

右用薑水煎

附方

交加散 治食瘧神効

肉豆蔻生二箇一煨 草豆蔻生二箇一煨 甘草二錢半炒半生

厚朴二錢半炒半生 生薑一兩半煨半生

右用薑水煎發日五更服

仲景白虎加桂枝湯 治溫瘧

知母 六錢

桂枝

黃芩 各一錢

栝實根 二錢

甘草 炙

牡蠣

乾薑 各一錢

右用水煎服汗出即愈此少陽經藥也

桂枝羌活湯 治瘧處暑以前頭痛脈浮惡風有汗

桂枝

羌活

防風

甘草 各一錢五分

右水煎服吐加半夏其六

麻黃羌活湯 治症如前但惡寒無汗

麻黃 去節

羌活

防風

甘草 各半兩

右如前服加法同二方太陽經藥也

白芷湯 治瘧身熱日痛熱多寒少脈長先以太柴胡下之微

利為度餘熱不盡當服此湯

白芷

一兩

知母

一兩七錢

石膏

四兩

右粗末依前服陽明經藥也

桂枝芍藥湯

治瘧寒熱不論先後此太陽陽明合病寒熱作

則必戰經曰熱勝而動也發熱則必汗泄經曰汗出不愈知

內熱也乃陽盛陰虛之證此湯主之否則又而傳於陰經矣

桂

五分

黃芪

炒 知母

石膏

芍藥

各二錢

右粗末水煎此太陽陽明經藥也

桂枝黃芩湯

如服前藥轉甚三陽合病也宜此和之

柴胡

一錢五分

黃芩

人參

甘草

各八分

半夏

石膏

知母

各五分

右每粗末依前服如外邪已解而內未已再服下藥從邪至
午發太柴胡下之從午至酉發邪氣在內也太承氣下之從
酉至子發或至寅發邪氣在血也桃仁承氣湯下之微利後
更以小柴胡湯徹其邪氣按此太陽陽明少陽經藥也以上
諸方並係發風寒暑熱之氣自外而入中於三陽之經者也
桂枝石膏湯 治瘧疾隔日先寒後熱寒少熱多
桂枝五錢 石膏一兩五錢 知母一兩五錢 黃芩一兩
右分三服水煎此太陽陽明經藥也隔日發者邪氣所舍深
者也

麻黃黃芩湯 治瘧發如前症而夜發者

麻黃一兩去節

甘草炙三錢

桃仁三十箇去皮尖

黃芩錢五

桂錢二

右依前服桃仁味苦甘辛肝者血之海血驟則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此湯發散血中風寒治風暑深入陰分乃血受病邪氣所舍尤深者也麻黃桂枝桃仁等乃太陽經血藥非三陰經藥也

附方

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯

三方見二十四卷第六論

藿香正氣散

方見二十一卷第十論

人參養胃湯

方見七卷第十八論

二十五

小柴胡湯方見二十四卷第二論

逍遙散

加味歸脾湯二方見二十四卷第四論

妊娠霍亂方論第十一

夫飲食過度觸冒風冷陰陽不和清濁相干謂之霍亂其間或先吐或腹痛吐利是因於熱也若頭痛體疼發熱是挾風邪也若風折皮膚則氣不宜通而風熱上衝為頭痛若風入腸胃則泄利嘔吐甚則手足逆冷此陽氣暴竭謂之四逆妊娠患之多致傷胎也

愚按前症若因內傷飲食外感風寒用藿香正氣散若因飲食停滯用平胃散果脾胃頻傷陽氣虛寒手足逆冷者須用

溫補之劑治當詳審毋使動胎也

附治驗

一妊婦霍亂已止但不進飲食口內味酸泛行消導寬中余曰此胃氣傷而虛熱也當用四君子湯彼不信乃服人參養胃湯嘔吐酸水其胎不安是藥復傷也仍與四君子湯俾其熱令患者先嗅藥氣不作嘔則呷少許恐復嘔則胎為釣動也如是旬餘而愈

人參散 治脾胃虛寒霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不化

人參

厚朴薑製

橘紅各一錢

當歸

乾薑炮

甘草各五分

右用棗水煎服

人參白朮散

治脾胃虛弱吐瀉或吐瀉作渴不食

白朮

茯苓

人參

甘草炒

木香

藿香

各五分

乾葛

錢一

右用水煎服吐甚加生姜汁頻飲之

縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐瀉宜沉冷頻服

草薢仁

兩四

烏梅肉

兩三

甘草

炒二

兩半

右每服半兩用姜十片水煎

木瓜煎

治吐瀉轉筋絕

吳茱萸

湯炮七次

生薑

切各一分

木瓜

木刀切兩半

右每服二三錢用水煎

治霍亂其効神速一方有黃連無扁豆仍與第一論通用姪婦

太醫院校註婦人良方 十四卷

霍乱腹痛四肢冷逆汗脉細理中湯治之傷食加陳皮寒甚

脉欲絕陰症悉具加炮附子方見二十卷

竹茹湯 治霍乱熱渴脉數見七卷嘔吐門

附方

藿香正氣散 方見二十一卷第十論

平胃散 方見七卷第十八論

四君子湯 方見二十四卷第六論

人參養胃湯 方見七卷第十八論

五苓散 方見二十一卷第十論

理中丸 方見二十卷第八論

香薷飲 方見七卷第二論

太醫院校註婦人良方大全卷之十四

終

太醫院校註婦人良方大全卷之十五

江右臨川陳自明良甫編

太醫院使立齋薛已校註

建邑書林泗泉余彰德梓

妊娠世傳方論第一

論曰妊娠泄瀉或青或白水穀不化腹痛腸鳴謂之洞泄水穀不化喜飲嘔逆謂之協熱下利並以五苓散利小便次以黃連阿膠丸或三黃熟艾湯以安之若瀉黃有沫腸鳴腹痛脉沉緊數用戊己丸和之愛腐不食胃脉沉緊用感應丸下之後調和脾胃若風冷水穀不化如豆汁用胃風湯寒冷臍下陰冷動泄用理中湯治中湯伏暑心煩渴瀉水用四苓散傷濕泄瀉小便

自利用不換金正氣散胃苓湯此四證之本畧也仍參第八卷
第八論主之

愚按米食所傷用六君加穀蘖麵食所傷用六君加麥蘖肉
食所傷用六君加山查若兼寒熱作嘔乃肝木侮脾土用六
君加柴胡生薑蕪嘔吐腹痛手足逆冷乃寒水侮土六君加
薑桂不應錢氏益黃散若元氣下陷發熱作渴肢體倦怠
用補中益氣湯若泄瀉色黃乃脾土之真色用六君加木香
肉果若作嘔不食腹痛惡寒乃脾土虛寒用六君加木香薑
桂若瀉在五更侵晨飲食少思乃脾腎虛弱五更服四神丸
日間服白朮散如不應或愈而復作或飲食少思急用八味
丸補命門火以生脾土為善不可忽也

附治驗

邊太常側室姪娠泄瀉自用枳木黃連之類腹悶吐痰發熱惡寒飲食到口即欲作嘔強匙許即吞酸不快欲用祛痰理氣余曰此因脾胃傷而痰滯中脘若治痰氣復傷脾胃矣遂以參朮炮薑為末丸如黍粒不時含嚥三五丸漸加至三百後日進六君子湯而尋愈

進士王綴徵之內懷姪泄瀉惡食作嘔余曰脾氣傷也其君憂之強進米飲余謂飲亦能傷胃且不必強俟脾胃醒而滯自化飲食自進不信別用人參養胃湯飲之吐水酸苦又欲投降火寒藥余曰若然則胃氣益傷也經云損其脾胃者調其飲食適其寒溫後不藥果愈

厚朴丸 治洞泄寒中

乾薑

炒

厚朴

去皮等分

右水拌炒為末水糊丸梧子大每服五十丸米飲下

草菓散

治虛寒泄瀉腹痛無度

厚朴

薑汁拌炒二兩

肉豆蔻

牛蒡麵煨

草豆蔻

十箇煨

右每服三錢用薑水煎

附方

附子理中湯

方見二十卷第八論

理中丸

五苓散

二方見二十一卷第十論

六君子湯

補中益氣湯

二方見二十四卷第六論

錢氏益黃散 方見二十一卷第九論

四神丸 方見八卷第八論

七味白朮散 方見二十一卷第二論

八味丸 方見二十四卷第十一論

妊娠下痢黃水方論第二

論曰妊娠飲食生冷脾胃不能消化致令心腹疼痛若血分病則色赤氣分病則色白血氣俱病則赤白相雜若熱乘太腸血虛受患則成血痢也

愚按治痢之法當參前篇其下黃水乃脾土虧損真色下陷也當補益中氣若黃而兼青乃肝木剋脾土宜平肝補脾若黃而兼白乃子令母虛須補脾胃若黃而兼黑是水反侮土

矣必治補脾胃若黃而熱赤乃心母益子但補中益氣若腸胃虛弱風邪客之用胃風湯或胎氣不安急補脾胃而自安矣凡安胎之藥當臨病制宜不必拘用阿膠艾葉之類

附治驗

地官胡成甫之內姪娘久病自用消導理氣之劑腹內重墜胎氣不安又用阿膠艾葉之類不應余曰墜重墜下元氣虛也胎動不安內熱盛也遂用補中益氣而安又用六君子湯全愈

治姪娘利黃水

厚朴

薑汁炙

黃連

二兩

肉豆蔻

五箇連皮

方用水煎徐徐服忌如前並出產寶

治妊娠熱痢

黃連升一

黃蘗升一

梔子仁廿十

右用每服五錢水煎嘔加橘皮生薑

治妊娠下痢腹痛小便澀滯

糯米合一

當歸炒

黃芪各一兩

右用水煎分四服

治臨產下痢用梔子炒為末每服二錢白湯調甚效

附方

胃風湯方見十二卷第九論

補中益氣湯方見二十四卷第六論

妊娠大小便不通方論第三

夫妊娠大小便不通由臟腑之熱所致若太腸熱則太便秘不通
小腸熱則小便不利大小腸俱熱更推其因而藥之

愚按前症若太腸血燥用四物湯加條芩桃仁太腸氣滯用
紫蘇飲加杏仁條芩腸胃氣虛用六君子加紫蘇杏仁肝脾
蘊熱用龍膽瀉肝湯心肝虛熱用加味道遙散加車前子

附治驗

亞卿李浦汀側室妊娠大小便不利或用降火理氣之劑元
氣反虛肝脉弦急脾脉遲滯視其面色青黃不澤余曰此鬱
怒所致也用加味歸脾湯為主佐以加味道遙散而安

主政王天成之內妊娠痢疾愈後二便不通其家世醫自用
清熱之劑未効余診其脉浮大而瀉此氣血虛也朝用八珍

湯加桃仁杏仁用加味道遙散加車前子而瘥

當歸散

治妊娘因怒肚腹脹痛四肢浮腫氣急作喘太便秘

小便澀產門腫

當歸分五

赤茯苓

枳殼燒

白芍藥

川芎各一錢

白薑炮

木香煨

粉草各三分

右用薑水煎氣弱枳殼減半太便秘加蜜同煎

治妊娘大小便不通腹脇痞悶不思飲食

大黃炒

木通

檳榔各一兩

枳殼燒炒三錢

訶梨勒

四箇去核半生半煨

大腹子三枚

右為末用童便一盞葱白二寸煎六分調服二錢

初虞世治妊娘風氣太便秘澀

枳殼三兩 麩炒

防風二兩

甘草炙 兩

右為末每服一錢空心用白滾湯調日三服

小品治姙娠小便不利氣急服猪苓散不瘥用甘遂為末蜜和服豆許微利之末利再服利後仍服猪苓散

猪苓散 治姙娠小便澀痛及胎水猪苓去皮為末白湯調下

錢許加至二錢日三夜二服

又方車前子一兩太黃半兩炒為末每服三錢蜜湯調

附方

四物湯

六君子湯 二方見二十四卷第六論

紫蘇飲 方見二十四卷第八論

龍膽瀉肝湯方見二十四卷第八論

加味逍遙散

加味歸脾湯

八珍湯三方見二十四卷第四論

妊娠小便不通方論第四

夫妊娠小便不通為小腸有熱傳於脬而不通耳若熱心肺氣滯則致喘急陳無擇云妊娠胎滿逼胞多致小便不利若心腎氣虛清濁相干而為諸淋若胞系系於臍小便不通名曰轉胞若胞滿尿出名曰遺尿

愚按丹溪先生轉脬小便閉多因胎婦虛弱憂悶性躁食味厚古方用消利疎導藥鮮效若脬為胎所墮而不通但升舉

其胎胞系踈而小便自行若臍腹作脹而小便淋閉此脾胃氣虛胎壓尿胞四物二陳參朮空心服後探吐數次自安竊謂前症亦有脾肺氣虛而不能下輸膀胱者亦有氣熱鬱結膀胱津液不利者亦有金為火燥脾土濕熱甚而不利者更當詳審施治

附治驗

司徒李杏岡仲子室孕五月小便不利諸藥不應余曰非八味丸不能救不信別用分利之藥肚腹腫脹以致不起儒者王文遠室患此小腹腫脹幾至於殆用八味丸一服小便滴瀝再以前丸之料加車前子一劑即利肚腹頓宛而安八味丸治婦人飲食如故煩熱不得卧反倍思因脾系子處

不得溺名轉瞬但利小便則愈蓋此藥有茯苓故也緩則不

救方見二十四卷第十一論

古今錄驗妊娠小便難飲食如故

當歸

貝母太心炒

苦參各三兩

滑石半兩

右為末煉蜜丸小豆大每服二三十九米飲下

治妊娠小便不通臍下妨悶心神煩亂

葵子研

榆白皮切各一兩

葱白七莖

右水煎分三服

古今錄驗妊娠不得小便杏仁去皮尖炒黃蘗九燈心湯吞下

又方滑石末水和塗臍下

又方用專前草汁調滑石末塗臍周圍四寸熱熨之

又方搗杏仁入滑石末飯丸小豆大每服二十丸白湯下

又方用紫苑為丸壯花水調下二錢

葵子散

治妊婦小便不利身重惡寒眩暈及水腫用葵子五

兩赤茯苓五兩為末每服二錢米飲調

附方

四物散

方見二十四卷第六論

二陳湯

方見二十四卷第五論

妊婦子淋方論第五

妊婦小便淋者乃腎與膀胱虛熱不能制水然妊婦胞繫於腎

腎間虛熱而成斯症甚者心煩悶亂名曰子淋也
愚按前症若頸項節攣語瀉痰甚用羚羊角散治小便清少

淋瀝用安榮散若肝經濕熱用龍膽瀉肝湯若肝經虛用
如味逍遙散腿足轉筋而小便不利急用小味丸緩則不致
若服燥劑而小便頻數或不利用生地茯苓牛膝黃柏知母
芡歸甘草若頻數而色黃用四物加黃柏知母五味麥門玄
參若肺氣虛而短少用補中益氣加山藥麥門若陰挺痿痺
而頻數用地黃丸若熱結膀胱而不利用五淋散若脾肺燥
不能化生宜黃芩清肺飲若膀胱陰虛陽無所生用滋腎丸
若膀胱陽虛陰無所化用腎氣丸

附治驗

一婦人每怒發熱胸脹小便淋瀝如遇經行旬餘未已受胎三
月因怒前症復作朝用加味逍遙散夕用安胎飲各二劑而

安五月又怒復下血如經行四月未止仍用前藥而愈
一姪娘飲食後因怒寒熱嘔吐頭痛惡寒胸腹脹痛太便不
實其面青色小便頻數時或有血服安胎止血之劑益甚余
曰寒熱嘔吐而腹脹此肝木剋脾土而元氣傷也太便不實
而面青此飲食傷脾兼肝侮土也小便頻數而有血此肝熱
傳胞而兼挺痿也用六君子加枳殼紫蘇山梔二劑脾胃頻
醒又用加味逍遙散加紫蘇枳殼二劑小便頻清後節飲食
調理而安

地膚大黃湯 治子淋

大黃炒

地膚草略三

知母

黃芩炒

猪苓

赤芍藥

通草

升麻

枳實炒

甘草各二兩

每服四五錢水煎服

安榮散

治子淋甚妙

麥門冬心去

通草

滑石

當歸

燈心

甘草

人參

細辛各王分

右水煎服

治小便淋痛心煩悶亂

藿麥穗

赤茯苓

桑白皮

木通

葵子各錢

黃芩炒

芍藥

枳殼

車前子

炒各五分

右水煎服

治子淋小便澀痛ラ

〇大醫局 交主

冬葵子

滑石

木通

各等分

右每服四五錢，葱白七寸水煎

猪苓散

療子淋小便澀痛

方見本卷第三論

附方

羚羊角散

方見四卷首論

龍膽瀉肝湯

方見二十四卷第八論

加味逍遙散

四物湯

二方見二十四卷第四論

腎氣丸

即六味丸

六味丸

八味丸

二方見二十四卷第十一論

六君子湯

補中益氣湯 二方見二十四卷第六論

五淋散

滋腎丸

黃芩清肺飲 三方見八卷第一論

安胎飲 方見十二卷第二論

本草綱目卷第六

妊娠尿出不知用白薇芍藥為末酒調下或白礬牡蠣為末酒調二錢或鷄毛灰末酒服一七或炙桑螵蛸益智子仁為末冰飲下

愚按前症若脾虛者宜用加味逍遙散若脾肺氣虛宜用補中益氣湯加益氣若肝腎陰虛宜用六味丸

附治驗方藥

一妊婦遺尿內熱肝脉洪數按之微弱或兩太陽作痛脇肋作脹余以爲肝火血虛用加味逍遙散六味地黃丸尋愈後又寒熱或發熱或患怒前症仍作用八珍散逍遙散無服以清肝火養肝血而痊

附方

加味逍遙散

八珍湯二方見二十四卷第四論

補中益氣湯方見二十四卷第六論

六味地黃丸方見二十四卷第十一論

妊娠承血方論第七

姪姪尿血內熱乘於血分以致血熱流滲於脾名字淋用葵子
一升研細水五升煮二升分三服或生艾葉一片酒五升煮二
升分三服或生地黃一斤酒四升煮二升分三服亦治落產後
下血

愚按前症因怒動火者宜小柴胡加山梔因勞動火者宜補
中益氣湯若因厚味積熱宜用加味清胃散若因肝經血熱
宜用加味道遙散若因脾氣下陷宜用補中益氣湯若因脾
虛血熱宜用加味道遙散

附治驗

一姪婦因怒尿血內熱作渴寒熱往來胸乳間作脹飲食少思
肝脉弦弱此肝經血虛而熱也用加味道遙散六味地黃丸

煎服漸愈又用八珍湯加柴胡丹皮山梔而痊

續斷湯 治姙娠下血及尿血

當歸 生地黄各一兩 續斷半兩 赤芍藥五錢

右為末每服二錢空心用葱白煎湯調下

治姙娠尿血

阿膠炒為末四兩 熟地黄用生者四兩酒拌蒸熟研膏

右和九桐子大每服七八十丸空心粥飲下

五苓散去桂加阿膠炒同為粗末 每四錢用車前子白茅根水煎溫服

又方白茅根濃煎湯吞酒蒸黃連丸

附方

小柴胡湯 方見二十四卷第二論

補中益氣湯方見二十四卷第六論

加味清胃散方見二十四卷第一論

加味逍遙散

加味歸脾湯二方二十四卷第四論

妊娠胎水腫滿方論第八

產乳集云妊娠三月足腫至腿出水飲食不甘似水腫謂之子氣至分晚方消者此脾胃氣虛或衝任經有血風名醫錄云宋少主元徽與徐文伯微行學鍼法文伯見一妊婦足腫脉之少主曰此女形也文伯曰此鬼胎也在左而黑遂用鍼胎下現然亦有脾虛水氣流溢或因瀉痢臟腑虛寒或因瘡疾飲水脾虛濕漬或因水漬於胞不能分利皆致腿足肚腹腫症也

愚按前症若胸滿腹脹小便不通遍身浮腫用鯉魚湯脾胃
虛弱佐以四君子若面白虛浮肢體如水氣用全生白朮散
如未應用六君子湯脾虛濕熱下部作腫用補中益氣加茯苓
苓若飲食失宜嘔吐泄瀉用六君子湯若腿足發腫喘悶不
安或指縫出水用天仙藤散脾胃虛弱兼四君子湯如未應
用補中益氣湯若脾肺氣滯用加味歸脾湯佐以加味逍遙
散

附治驗

一姙娘每胎至五月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身
後及頭面此是脾肺氣虛朝用補中益氣夕用六君子加蘇
梗而愈凡治姙娘毋泥月數但見其經症即用本藥爲善

天仙藤散

治婦人有水氣而成胎以致兩腿足浮腫

天仙藤

洗暑炒

香附子炒

陳皮

甘草

烏藥

軟白者辣者良各五分

右每服五錢生薑木瓜蘇葉各三片水煎日三服

澤瀉散

治妊娠遍身浮腫上氣喘急大便不通小便赤澀

澤瀉

桑白皮炒

木通

枳殼

炒

檳榔

赤茯苓

各五分

右薑水煎服

防已散

治脾虛遍身浮腫腹脹喘促小便不利

防已

錢三

桑白皮

炒

紫蘇葉

赤茯苓

各五分

木香

分二

右薑水煎

千金鯉魚湯

治妊婦腹大胎間有水氣

白朮

兩五

茯苓

兩四

當歸

芍藥

兩三

右先以小鯉魚一頭如食法煮取汁每汁二盞入藥伍錢薑七片橘皮少許煎七分空心服

腎着湯

治妊婦腰脚腫

茯苓

白朮

各八分

乾薑炮

甘草

各一分

杏仁

五分

右用水煎

五皮散

治胎水腫滿

大腹皮

桑白皮炒

生薑皮

茯苓皮

橘皮

各一錢

木香

二分

右水煎服

治妊婦脚浮腫因脾衰血化成水用生料平胃散薑棗水煎服

或為末用蘇葉湯調下每服二錢

全生白木散

治妊婦面目浮虛四肢腫如水氣名曰胎氣名

曰胎腫

白木一兩

生薑皮

大腹皮

陳皮

白茯苓各半兩

右各為末每服二錢米飲下

附方

四君子湯

六君子湯

補中益氣湯 三方見二十四卷第六論

加味歸脾湯

加味逍遙散

二方見二十四卷第四論

妊娠腹內鍾鳴方論第九

治孕婦腹內鳴用鼠窠中土為末入麝香酒調下二錢立愈或黃連濃煎汁母當啖之

愚按產寶云小兒在腹中哭其治法亦用空房中鼠穴土或黃連煎濃飲之即止想即是症又云臍帶上疔瘡兒含口中因姪婦登高奎臂脫出兒口以此作聲令姪婦曲腰就地如拾物仍入兒口即止然黃連性寒麝香開竅當酌量用之

治孕婦用烏藥五錢水煎七分入牛皮膠一兩煎化溫服

治孕婦用烏藥五錢水煎七分入牛皮膠一兩煎化溫服

或意以仕煮汁飲之

愚按孕雖即是腹內患，癰如前法不應宜用牡丹皮散或意以湯治驗見二十四卷

妊娠不語論第十一

孕婦不語不須服藥臨產月但服保生丸四物湯產下便語黃帝問曰人有重身九月而暗何也岐伯對曰胞絡繫於腎腎脈貫繫舌本故不能言十月分娩後自爲之言也

愚按前症果內經窮理之言人有患此當調攝以需之不必驚畏而泛用藥也

妊娠傷食論第十二

經曰飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之五宮

傷在五味故妊娠傷食最難調治者

愚按東垣先生云脾胃之氣壯則過時而不飢多食而不傷
蓋胃主司納脾主消化五臟之本也然食倍而傷者乃脾氣
虛而不化也若投以峻劑則脾胃復傷而胎亦損矣當審其
所因而調治之若飲食停滯或肚腹作痛用平胃散嘔吐惡
心加枳殼砂仁吞酸噯腐加黃連三分吳茱萸二分腹滿泄
瀉用六君子湯停滯肉食倍加山楂停滯麵食倍加麥蘖停
滯糯食用白酒麴末一味米食停滯倍加穀蘖魚腥所傷倍
加陳皮傷辛熱之物加黃連傷性冷之物加砂仁木香如不
應更加肉豆蔻補骨脂再不應用四神丸若脾氣下陷用補
中益氣湯凡噯覺寒氣且戒藥餌節飲食經云損其脾者調

其飲食適其寒溫太_平脾胃虛弱飲食難化以白朮陳皮為末等分陳麴糊丸常服最善枳朮丸但可暫用枳實峻厲能耗真氣治者慎之

附治驗

一妊婦因停食服枳朮丸胸腹不利飲食益少更服消導寬中之劑其胎下墜余謂此脾氣虛而不能承載也用補中益氣及六君子湯中氣漸健其胎漸安又用八珍湯加柴胡升麻調理而痊

木香丸 治妊婦脾胃虛弱飲食不消肚腹膨脹或嘔吐泄瀉

木香仁

白朮炒

人參

白茯苓

各等分

右為末麴糊丸黍豆大每服三四十九熟水下

白木散 治姙娠脾胃虛弱氣不調和飲食易傷

白木炒

紫蘇各一兩

人參

白芷

各三錢炒

川芎

訶子皮

青皮

各半兩

甘草

炒一錢

右每服二錢薑水煎

附方

平胃散 方見七卷第十八論

補中益氣湯

六君子湯 二方見二十四卷第六論

四神丸 方見八卷第八論

八珍湯 方見二十四卷第四論

姙娠臍痛方論第十三

許孝士云一婦無故數日悲泣是為臍痺用大東湯而愈又程
虎卿內姪娘五月慘感悲傷亦投大東湯而愈

一愚按前症或因寒水攻心或肺有風邪者治當審察

附治驗

二十四卷第四

一姪婦無故自悲用大東湯二劑而愈後復患又用前湯佐以
四君子加山梔而安

一姪婦悲衰煩躁其夫詢之云我無故但自欲悲耳用淡竹茹
湯為主佐以八珍湯而安

大東湯

甘草配

小麥配

大東散

右水六鍾煎三鍾分三服亦補脾氣

淡竹茹湯

治妊娠

心虛驚悸臍燥悲傷或作虛煩

麥門冬

小麥

半夏

湯炮各五分

人參

白茯苓

甘草

各五分

右薑棗并竹茹少許水煎

治胎臍燥悲哭用紅棗燒存性米飲調下

附方

四君子湯

方見二十四卷第六論

八珍湯

方見二十四卷第四論

大醫醫院校註婦人良方大全卷之五



